

Instructions Réalisation de frottis urinaires

Bien respecter les consignes suivantes :

Pour une bonne exécution de prélèvement il est fortement recommandé au patient de venir faire le prélèvement au laboratoire .

Le patient doit venir uriner au laboratoire 1h30 après avoir rejeté les urines de la nuit , sans avoir changé ses habitudes de boisson.

En cas d'impossibilité de vous déplacer le laboratoire vous remettra les flacons nécessaires pour la réalisation de cet examen.

1-1h30 après avoir rejeté les urines de la nuit marcher 15 minutes (15 min d'effort), puis recueillir l'urine (2^{ème} miction du matin) dans le pot à prélèvement (contenant un liquide conservateur) prévu à cet effet – si possible, remplir volume à volume.

ATTENTION : Ne pas jeter ce liquide. Ne pas avaler ce liquide

Fermer ce flacon en vissant à **FOND.**

Dans l'éventualité où votre envie d'uriner est faible, **forcez vous**, les contractions de votre vessie améliorent la richesse cellulaire de l'échantillon.

2-Répéter cette opération les 2 jours suivants en cas de prescription de 3 prélèvements à faire 3 jours de suite.

3-Après recueil de chaque urine, **mettre immédiatement chacun des pots au réfrigérateur**, noter sur les flacons la date d'émission et rapporter le plus rapidement possible le ou les prélèvements au laboratoire.

5- Mettre le(s) flacon(s) dans un sachet de transport avec la prescription

Attention : Tout prélèvement ne portant pas les informations demandées pourra être refusé

Instructions Réalisation de frottis urinaires

Bien respecter les consignes suivantes :

Pour une bonne exécution de prélèvement il est fortement recommandé au patient de venir faire le prélèvement au laboratoire .

Le patient doit venir uriner au laboratoire 1h30 après avoir rejeté les urines de la nuit , sans avoir changé ses habitudes de boisson.

En cas d'impossibilité de vous déplacer le laboratoire vous remettra les flacons nécessaires pour la réalisation de cet examen.

1-1h30 après avoir rejeté les urines de la nuit marcher 15 minutes (15 min d'effort), puis recueillir l'urine (2^{ème} miction du matin) dans le pot à prélèvement (contenant un liquide conservateur) prévu à cet effet – si possible, remplir volume à volume.

ATTENTION : Ne pas jeter ce liquide. Ne pas avaler ce liquide

Fermer ce flacon en vissant à **FOND.**

Dans l'éventualité où votre envie d'uriner est faible, **forcez vous**, les contractions de votre vessie améliorent la richesse cellulaire de l'échantillon.

2-Répéter cette opération les 2 jours suivants en cas de prescription de 3 prélèvements à faire 3 jours de suite.

3-Après recueil de chaque urine, **mettre immédiatement chacun des pots au réfrigérateur**, noter sur les flacons la date d'émission et rapporter le plus rapidement possible le ou les prélèvements au laboratoire.

5- Mettre le(s) flacon(s) dans un sachet de transport avec la prescription

Attention : Tout prélèvement ne portant pas les informations demandées pourra être refusé